

# 前立腺がん検診(50歳以上男性)

対象者は当年度9月末時点の在籍者。年齢は当年度4月1日現在です。



指先から採取した血液から前立腺肥大や前立腺がん  
に反応しやすいといわれる  
PSA(前立腺特異抗原)とい  
われるたんぱく質を測定し  
ます。

## <採取方法>

- 専用の器具で指先から血液を採取します。



● テーブル(机など)の上に指を置きます。指のやわらかい部分に、採血器具の先端を強く押しあて、白いボタン(穿刺ボタン)を押してください。針が出るのは1回のみです。

※特定の疾患の治療中で薬剤(ヘパリン・ワーファリン・ウロキナーゼ等)を服用し止血機能が低下している方は、検査の申込みができません。

※前立腺や泌尿器関連の疾患で治療中の方、特定薬物(抗男性ホルモン剤など)使用中の方、長年寝たきりになっている方は、正確な検査結果が出ないことがあります。

## 前立腺がん

### 50歳になったら年に一度は受けましょう!

前立腺がんはサイレントキラー!! 自覚症状がありません。

**自覚症状のない初期に発見し、適切な治療をすることが大切**です。

がんの症状が出てから診断がついた場合、**20~30%**の方が進行がん・転移がんの状態です。

